

(五十三) (王庚)

續銀海新編
(金五) (姚步石)
沖和養胃湯——開神陰顯胃實
散。四君升柴求返還。歸芍黃
芪光五味。葛根枳風引過關。
14 瞶神毒天之症
氣為怒傷成內療。初昏如霧漸
失光。見一或二或黑花。瞶神
散毒無方。
狀見瞶神如好眼。少大些
許。初不為意。不過視小
反大。昏如霧露。空中黑
花。係腎水漸乾之故。
千金磁珠丸鎮墜主之。——合欄
滋陰地黃湯——氣為怒傷滋陰
丸。二地參甘補真元。天多歸
木柴返還。地骨五味保自全。
益陰腎氣丸——益陰腎氣六味
君。五味柴胡歸尾參。
開氣湯——瞶神散大實喘急。
開氣湯用柏知母。歸芍生地陳

(俞步卿)

(三) 怒氣上逆者 經曰：怒則氣上。又曰：大怒則血逆于上。使人薄厥。況妊娠之婦。血塞于胎。不榮于肝。是以肝氣易旺。怒則氣逆。血亦隨之。血逆于膈。遂致驟然昏厥而爲癰矣矣。治宜平肝降逆。用白芍、金匱等藥。

(四) 痰濁上逆者 婦人懷孕。腹內氣機。必致阻滯。氣滯則生溼。積滯則生痰。或因腹大而重加束縛。或因惡阻而多食酸膩。以致氣機阻滯。痰涎留戀。甚則上塞于心肺之間。遂爲癰厥。宜順氣化痰。用旋覆代赭等治之。

(五) 胎氣上迫者 懷胎八九月。胞胎已大。因胎盤重下口狹小。胎位太高。以致氣不得降。上逆爲癰。宜服交骨下胎之藥。使其胎兒早日墮下。庶可救也。西醫治法。常用解剖。但不如中醫治之穩當也。

(完)

途健婦指痛疾婦解
徑康女導苦病女決

[illegible]

歡迎投寄

口效方 (戴橘圃)
烏背鯽魚一個一兩。婦人頭垢三錢。公猪眼梢一對。同搗敷之。

遺精病治療法(十三)(林慶兆)

蓋制而不行者。硬苦。以理處之。則順暢。困思心氣和平。非絕於往日。但末如此。八九月之無間斷。又往日間和平多無事之時。今乃能於逆境權脫。權學之不繼也。故特書於冊。冀日新又新。讀書窮理。從事於敬恕之間。漸進於克己復禮之地。此吾志也。效之遇速。非吾敢知。(吳康齋)

倦臥夢寐中。時時驚怒爲過時不能學也。(吳康齋)

中堂讀倦。遊後園歸。絲桐三弄。心地悠然。日明風靜。天壤之間。不知復有何樂。(吳康齋)

七月十二夜。枕上思家計甚苦。不堪其處。反覆思之。不得其方。日晏未起。久之方得。蓋亦別無巧法。只隨分節用安食而已。聲聲懺雲。不敢易初心也。(吳康齋)

貧困中。事務紛至。兼以病瘧。不免時有憤躁。徐整衣冠讀書。便覺意思通暢。(吳康齋)

添如秋水食中味。和似春風靜後功。(吳康齋)

力除閒習固守清貧。(吳康齋)

夜大雨屋漏無乾處。吾意泰然。(吳康齋)

(未完)

盜汗之研究

盜汗一症。時醫皆謂爲陰虛。故多用補陰固澀滑瀉之藥。如屬陰虛。補陰之藥。正是對症良方。然盜汗亦有因於濕熱者。夫濕熱內蒸。若投與補陰之藥。助紂爲虐。反增其害。豈不憤哉。蓋濕爲水分過多。如衛氣堅固。腠理密緻。濕邪無從發泄。鬱於肌膚。卽爲濕熱。衛氣虛疏。捍衛無權。濕熱相蒸。熱氣內迫。乘衛虛以外出。爲自汗。衛氣壅行於關。夜行於陰。濕屬陰邪。邪甚相抗。隨衛氣以行於陰。卽爲盜汗。如醫家所云。水分過多。流溢於靜脈。汗竅開發。水不容納故也。此症治法。與治陰虛盜汗。有天壤之別。陰虛以補陰爲主。如參耆歸膠阿膠白朮之屬。濕熱以清濕熱爲主。薏苡石茯苓沙參麥冬白朮之屬。尚陰虛以治濕熱之藥。則陰虛而愈甚矣。濕熱以治陰虛之藥。則濕邪泛濫。而汗反增矣。差之毫厘。謬若千里。爲醫者。豈可不小心研究乎。然濕熱所異之點。必見小便短赤。舌苔厚滑。脈濡帶數。口不甚渴。而陰虛之症。則見斯其脈洪大。小便長白。舌苔光燥。可以分別之。審證用藥。自不致誤。

季關三日刊